



Vejledning ifm operation i fuld bedøvelse

Inden operationen:

Såfremt barnet er sygt og/eller har feber dagen før eller på operationsdagen, bedes I kontakte klinikken. Hvis sygdommen skyldes forkølelse eller mellemørebetændelse kan barnet som regel opereres alligevel. Barnet må gerne drikke rigeligt om aftenen.

På operationsdagen:

Af hensyn til barnets sikkerhed er det vigtigt at barnet er fastende et vist antal timer inden bedøvelsen.

Fasteperioden afhænger af barnets alder:

- *Spædbørn der ammes skal faste 4 timer*
- *Øvrige børn skal faste i 6 timer (inkl. mælke-produkter), men kan tilbydes små mængder vand indtil 2 timer før bedøvelse.*

Barnet må **ikke** få slik eller tyggegummi i fasteperioden.

Smertestillende medicin:

Barnet skal have en smertestillende stikpille eller mixtur Pamol/Panodil/paracetamol **2 timer** før operationstidspunktet. Dosis er højere end I er vant til.

Smertebehandling:	Præparattype	Dosering
Dræn og polypper	Pamol/panodil	50-70 mg/kg/dg
Operation på madlerne	Voltaren	3 mg/kg/dg

Bemærk: Voltaren i børnedosering (12,5 og 25 mg) kun kan købes på Stengades Apotek

Anæstesi (fuld bedøvelse)

Anæstesilægen er børneanæstesilæge med meget stor rutine. Barnet bedøves med en anæstesigas, der hedder Sevorane. Virkningen indtræder meget hurtigt, dvs i løbet af ½-1 minut. Under anæstesen gives desuden ilt og i nogen tilfælde lattergas.

Når tilførslen af anæstegassen afbrydes vågner barnet op i løbet af få minutter. Der er kun meget sjældent bivirkninger af Sevorane. Der er for eksempel sjældent at selve anæstesen er skyld i kvalme og opkastninger efter opvågningen.

Hjemtransporten:

Bør ikke foretages med bus eller tog, men evt. i taxa eller privat bil. Såfremt der er blødningsrisiko og man selv er kørende, bør der være yderligere en voksen til at tage sig af barnet, hvis der er risiko for blødning.

Efter operationen:

Resten af dagen bør barnet holdes i ro.

Hvis der er opereret på polypper eller mandler: Lidt blod i spytet er tilladeligt, men skulle der komme lidt blødning fra næse eller mund, skal man lade barnet sutte på knuste isterninger. Standser blødningen ikke efter 15-20 min, kan du forsøge, at kontakte mig på nedenstående telefonnummer eller tage på skadestuen. Efterblødning er uhyre sjældent, men søg læge hvis du er i tvivl.

Det er i øvrigt vigtigt at barnet indtager rigelige mængder kolde drikke (uden brus) og herefter kølig kost, f.eks. yoghurt og vanillieis.

Dagene efter operationen:

Dræn: Barnet kan genoptage sædvanlige aktiviteter dagen efter operationen.

Polypper : Barnet bør holdes hjemme fra institution/dagpleje/skole en til to dage efter operationen. I øvrigt efter aftale.

Mandler: Barnet bør sædvanligvis holdes hjemme fra institution/dagpleje/skole 6 dage efter operationen. I øvrigt efter aftale.

Efterkontrol:

Dræn og polypper: efter aftale.

Mandler: dagen efter samt efter en uge.

Mikkel Holmelund
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme

Karsten Bjerre-Jepsen
Speciallæge i anæstesilologi

NB: Klinikken har et telefonnr. som kan benyttes, **hvis jeres barn har behov for akut behandling i operationsdøgnet uden for normal telefontid: 4920 0707**

Jeg beder jer venligst om at respektere at telefonnummeret "tilhører" barnet og ikke andre: